

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Aardbei (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling direct na uitplanten of uitleggen	Stengelbasisrot ¹	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	-	35 dagen
Aardbei (bedekte teelt)	Druppelbehandeling direct na uitplanten	Stengelbasisrot ¹	0,1 gram, per 100 ml water; per plant 100 ml oplossing	11 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	35 dagen
Witlof (trekteelt op water)	Toevoegen aan proceswater binnen 24 uur na het opstarten	Wortel- en voetrot ²	0,025% (2,5 gram per 1000 liter water)	0,875 kg/ha	1 per teeltcyclus	-	Toepassen binnen 24 uur na het opstarten van de trek
Potplanten (bedekte teelt)	Aangieten, of via eb/vloed systeem	Wortel-, stengel- en voetrot ³	0,01% (10 gram per 100 liter water; 150 ml oplossing per liter potgrond)	10,26 kg/ha	2 per teeltcyclus	7	-
Snijbloemen m.u.v.	Druppelbehandeling	Wortel-, stengel- en	0,05%	7,5 kg/ha	2 per 12	10	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
roos (op kunstmatig substraat; bedekte teelt)	of aangieten	voetrot ⁴	(50 gram middel per 100 liter water; per plant 100- 250 ml oplossing)		maanden		
Roos (op kunstmatig substraat; bedekte teelt)	Druppelbehandeling of aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot ⁴	0,05% (50 gram middel per 100 liter water, per plant 100- 250 ml oplossing)	8,75 kg/ha	2 per 12 maanden	10	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*)

² Wortel- en voetrot (*Phytophthora cryptogea*)

³ Wortel-, stengel- en voetrot *Phytophthora cinnamomi*)

⁴ Wortel-, stengel- en voetrot (*Phytophthora* spp.)

Het gebruik in de teelt van druif, veldsla, opkweek van koolgewassen (bedekte teelt) en veredelingsteelt en basiszaadproductie van spinazie is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is/zijn voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van braam- en framboosachtigen (*rubus* spp), sla (*Lactuca* spp; bedekte teelt), rucola (bedekte teelt), kruiden (bedekte teelt), onbedekte teelt van peterselie, Lisianthus (bedekte teelt), lelie, Delphinium, Echinops en zonnebloem is op basis van een “derdenuitbreiding”. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van boomkwekerijgewassen en vaste planten is beoordeeld op basis van artikel 51 1107/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Druif (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹	0,6 kg /ha	0,6 kg /ha	3 per 12 maanden	1,8 kg/ha per 12 maanden	10	28
Braam- en framboosachtigen (<i>rubus</i> spp.)	Druppelbehandeling of aangieten	Stengelbasisrot ²	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	-	90
Sla; <i>Lactuca</i> spp. (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ³	0,03 % (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,6 kg/ha per teeltcyclus	7	14
Veldsla	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁴	0,36 kg/ha	0,36 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,72 kg/ha per teeltcyclus	7	14
Rucola	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,03 % (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,6 kg/ha per teeltcyclus	7	14

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Koolgewassen (opkweek op substraat; bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁶	3,0 kg/ha	3,0 kg/ha	4 per 12 maanden	12,0 kg/ha per 12 maanden	7	-
Kruidenteelt (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,03 % (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,6 kg/ha per teeltcyclus	7	14
Peterselie (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁵	0,03 % (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,6 kg/ha per teeltcyclus	7	14
Lisianthus (bedekte teelt)	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot ²	0,05% (50 gram per 100 liter water; per plant 100-250 ml oplossing)	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	6,0 kg/ha per 12 maanden	10	-
Lelie (bedekte snijbloementeelt)	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot ²	0,05% (50 gram per 100 liter water)	3,0 kg/ha	2 per 12 maanden	6,0 kg/ha per 12 maanden	7	-
Lelie (onbedekte snijbloementeelt)	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot ²	0,05% (50 gram per 100	0,5 kg/ha	2 per 12 maanden	1,0 kg/ha per 12 maanden	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
			liter water)					
Delphinium	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot ²	0,05% (50 gram per 100 liter water)	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	-	-
Echinops	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot ²	0,05% (50 gram per 100 liter water)	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	-	-
Zonnebloem (sierteelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁷	0,03% (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	2 per 12 maanden	0,6 kg/ha per 12 maanden	7	-
Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)	Aangieten	Wortel-, stengel- en voetrot ²	0,05% (50 gram per 100 liter water)	3,0 kg/ha	1 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	-	-
	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁹ Taksterfte ¹¹	0,03% (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	3 per 12 maanden		10	-
Boomkwekerij-gewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁹ Taksterfte ¹¹	0,03% (30 gram per 100 liter water)	0,3 kg/ha	3 per 12 maanden	0,9 kg/ha per 12 maanden	10	-
Vaste planten	Gewasbehandeling	Valse	0,03%	0,3 kg/ha	3 per 12	0,9 kg/ha	7	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
		meeldauw ^{9,10} Taksterfte ¹¹	(30 gram per 100 liter water)		maanden	per 12 maanden		
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van spinazie	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁸	0,36 kg/ha	0,36 kg/ha	2 per teeltcyclus	0,72 kg/ha per teeltcyclus	14	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ Valse meeldauw (*Plasmopara viticola*)

² Wortel-, stengel- en voetrot / stengelbasisrot (*Phytophthora* spp.)

³ Valse meeldauw (*Bremia lactuceae*)

⁴ Valse meeldauw (*Peronospora valerianellae*)

⁵ Valse meeldauw (*Plasmopara* spp.)

⁶ Valse meeldauw (*Peronospora parasitica*)

⁷ Valse meeldauw (*Plasmopara halstedii*)

⁸ Valse meeldauw (*Peronospora farinosa*)

⁹ Valse meeldauw (*Peronospora* spp.)

¹⁰ Valse meeldauw (*Plasmopara* spp.)

¹¹ Taksterfte (*Phytophthora* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen tijdens het mengen en laden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van op- en zijwaarts bespoten boomkwekerijgewassen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik gemaakt wordt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van druiven uitsluitend toegestaan vanaf BBCH 53, wanneer de bloei zichtbaar is.

Het middel is gevaarlijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Om residuen boven de MRL in volggewassen te voorkomen, is een wachttermijn vereist van tenminste 120 dagen tussen laatste toepassing en zaaien of planten. Dit geldt voor alle volggewassen waarvoor een MRL lager dan 0,05 mg/kg geldt, met uitzondering van granen, waarvoor geen wachttermijn is vereist.

Om residuen boven de MRL in volggewassen te voorkomen, kan na het gebruik van Paraat als druppelbehandeling op aardbeien geen voedings- of voedergewas geteeld worden.

Met Paraat behandelde zonnebloemen mogen niet voor humane of dierlijke consumptie worden aangewend.

Voor alle gewassen geldt dat indien nog geen ervaring is opgedaan met het middel, een proefbehandeling uitgevoerd dient te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas of variëteit te testen.