

23 juni 2023

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering # middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *2 Mycosphaerella*3	0,6 L/ha	3 per 12 maanden	1,8 L/ha per 12 maanden	7	3
Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> niet- eetbare schil (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *2 Mycosphaerella *3	0,6 L/ha	3 per teeltcyclus	1,8 L/ha per teeltcyclus	7	3
Vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *4	0,6 L/ha	2 per teeltcyclus	1,2 L/ha per teeltcyclus	7	3

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

*2 Echte meeldauw (*Sphaerotheca fuliginea* / *Podosphaera xanthii*, *Golovinomyces cichoracearum* / *Erysiphe cichoracearum*, *Leveillula taurica* / *Oidiopsis taurica*)

*3 *Mycosphaerella* (*Mycosphaerella melonis* / *Didymella bryoniae*)

*4 Echte meeldauw (*Leveillula taurica*, *Oidium neolycopersici*)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering# middel per toepassing	Maximale dosering middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids- termijn in dagen
Aardbei	Gewasbehandeling	Echte meeldauw *1	0,6 L/ha	0,6 L/ha	3	1,8 L/ha	7	1
Gerbera (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*6	1,0 L/ha	1,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
		Sclerotienrot*5	2,0 L/ha	2,0 L/ha				
Roos (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*7	1,0 L/ha	1,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
		Sclerotienrot*5	2,0 L/ha	2,0 L/ha				
Potplanten (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Snijbloemen (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Sclerotienrot*5 Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-
Snijbloemen (bedekte, niet- grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
Veredeling en zaadteelt (bedekte, grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	1	2,0 L/ha	-	-

Veredeling en zaadteelt (bedekte, niet-grond gebonden teelt)	Gewasbehandeling	Echte meeldauw*8 Roesten*9	2,0 L/ha	2,0 L/ha	10	20,0 L/ha	7	-
---	------------------	-------------------------------	----------	----------	----	-----------	---	---

Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

*1 Echte meeldauw (*Podosphaera aphanis*, *Podosphaera macularis* / *Sphaerotheca macularis*)

*5 Sclerotienrot (*Sclerotinia* spp.)

*6 Echte meeldauw (*Podosphaera xanthii* / *Oidium citrulli*)

*7 Echte meeldauw (*Podosphaera pannosa* / *Sphaerotheca pannosa*)

*8 Echte meeldauw (*Oidium* soorten, *Sphaerotheca* soorten, *Podosphaera* soorten, *Microsphaera* soorten, *Erysiphe* soorten)

*9 Roesten (*Puccinia* soorten, *Coleosporium* soorten, *Melampsora* soorten, *Uromyces* soorten, *Cronartium* soorten, *Phragmidium* soorten, *Gynosporangium* soorten)

Overige toepassingsvoorwaarden

Draag handschoenen bij werkzaamheden aan bloemisterijgewassen (inclusief gerbera, roos, veredeling en zaadteelt).

In de teelt van vruchtgroenten van aardbei het middel toepassen vanaf stolon vorming (BBCH 40).

In de teelt van vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met eetbare schil en vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met niet-eetbare schil het middel toepassen in 200 tot 1500 liter water per ha.

In de teelt van vruchtgroenten van *Solanaceae* het middel toepassen in 400 tot 1500 liter water per ha.

In de teelt van bloemisterijgewassen (inclusief gerbera, roos, veredeling en zaadteelt) het middel toepassen in 500 tot 1500 liter water per ha.

Om het grondwater te beschermen mag dit middel niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

In de bedekte teelt van vruchtgroente van *Cucurbitaceae* met eetbare en niet-eetbare schil en vruchtgroente van *Solanaceae* verdient het, in verband met kans op gewasschade, aanbeveling om in de winterperiode (oktober - maart) met een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas / cultivar geen schade ondervindt van een behandeling met het middel.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen difenoconazool en fluxapyroxad. Difenconazool behoort tot de triazolen (DMI fungiciden). De Frac code is 3. Fluxapyroxad behoort tot de Succinate dehydrogenase remmers (SDHI). De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.