

25 november 2022

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings gebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Appel	Groeibeheersing vegetatieve groei	1,0 - 2,5 kg/ha ^{1,2}	2,5 kg/ha	2	2,5 kg/ ha	21	55
		0,75 - 1,25 kg/ha ^{1,3}	1,25 kg/ha				
Peer	Groeibeheersing vegetatieve groei	1,0 - 2,5 kg/ha ^{1,2}	2,5 kg/ha	2	3,0 kg/ ha	21	55
		0,75 - 1,5 kg/ha ^{1,3}	1,5 kg/ha				

¹ dosering afhankelijk van de boomhoogte

² Toepassen tijdens de bloei (BBCH 60-69)

³ Toepassen na de bloei tot het stadium waarbij de vruchten ca. 50% van de uiteindelijke grootte bereikt hebben (BBCH 71-75)

Het gebruik in de teelt van aardbei, druif, bloemisterijgewassen, klimplanten, rozen, sierheesters, bos-en haagplantsoen, vruchtbomen en –struiken en vaste planten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Aardbei (onbedekte teelt)	Groeibeheersing vegetatieve groei	0,6 - 1,5 kg/ha ⁴	1,5 kg/ha	5 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	10
Druif	Bevordert open en losse structuur van de trossen, ter vermindering van de kans op ziekte aantasting	1,2 - 1,8 kg/ha	1,8 kg/ha	1 per 12 maanden	1,8 kg/ ha per 12 maanden	-
Bloemisterijgewassen	Groeibeheersing vegetatieve groei	0,10-2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	5
Klimplanten (onbedekte teelt)	Groeibeheersing vegetatieve groei	0,10-2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	5
Rozen (Boomkwekerijgewassen) (onbedekte teelt)	Groeibeheersing vegetatieve groei	0,10-2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	5
Sierheesters (onbedekte teelt)	Groeibeheersing vegetatieve groei	0,10-2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	5
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Groeibeheersing vegetatieve groei	0,25-2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	5
Vruchtbomen en -struiken	Groeibeheersing vegetatieve groei	1,0-2,5 kg/ha ^{1,2}	2,5 kg/ha	2 per 12 maanden	2,5 kg/ha per 12 maanden	21
		0,75-1,25 kg/ha ^{1,3}	1,25 kg/ha			

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Vaste planten	Groeibeheersing vegetatieve groei	0,25-2,5 kg/ha	2,5 kg/ha	6 per teeltcyclus, 30 per 12 maanden	3,0 kg/ha per 12 maanden	5

¹ Dosering afhankelijk van de boomhoogte

² Toepassen tijdens de bloei (BBCH 60-69)

³ Toepassen na de bloei tot het stadium waarbij de vruchten ca. 50% van de uiteindelijke grootte bereikt hebben (BBCH 71-75)

⁴ Toepassen tussen BBCH 15 (5^e echte blad uitgevouwen) en BBCH 43 (het begin van wortelontwikkeling van de uitlopers).

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van druif het middel toepassen 400 liter water per ha.

Om zoogdieren te beschermen is de toepassing in de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, klimplanten, sierheesters, bos- en haag plantsoen en vaste planten uitsluitend toegestaan wanneer de bodembedekking meer dan 70% is.

Voor peer is fytotoxiciteitonderzoek alleen uitgevoerd in het ras conference. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren in de overige rassen.