

6 april 2018

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden

**Toepassingsvoorwaarden:**

| Toepassingsgebied              | Werkzaamheid getoetst op | Dosering* middel per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Veiligheidstermijn in dagen                         |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wintergraan m.u.v. kanariezaad | Breedbladige onkruiden   | 1,0 L/ha                        | 1 per teeltcyclus                                              | -                                                   |
| Zomergraan                     | Breedbladige onkruiden   | 1,0 L/ha                        | 1 per teeltcyclus                                              | -                                                   |
| Graszaadteelt                  | Breedbladige onkruiden   | 1,5 L/ha                        | 1 per 12 maanden                                               | -                                                   |
| Voedergrasland                 | Breedbladige onkruiden   | 1,5 L/ha                        | 1 per 12 maanden                                               | 7 dagen tussen toepassing en beweiding en/of maaien |
| Grasvegetatie                  | Breedbladige onkruiden   | 1,5 L/ha                        | 1 per 12 maanden                                               | -                                                   |

\* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

**Overige toepassingsvoorwaarden**

In de teelt van graszaadteelt, voedergrasland en grasvegetatie het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Stro van behandeld graan en behandeld gras mag niet gebruikt worden voor mulching, compostering of teelt op stobalen.

Bij gevestigd voedergrasland en grasvegetatie is toepassing toegestaan gedurende het groeiseizoen. Bij jong voedergrasland en grasvegetatie is na-opkomst toepassing toegestaan vanaf februari tot en met september.

### Volggewassen

Als volggewas kunnen in hetzelfde jaar veilig granen, koolzaad en koolgewassen (geplant) en gras geteeld worden, in koolzaad is een tijdelijke lichte groeiremming mogelijk. In het volgende jaar gelden geen beperkingen

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen clopyralid, fluroxypyr-meptyl en florasulam. Clopyralid behoort tot de synthetische auxinen en fluroxypyr behoort tot de pyridine carboxylic acids, beide behoren tot HRAC code O. Florasulam behoort tot de triazolopyrimidines (HRAC code B). In Nederland zijn onkruiden aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met HRAC code B. Omdat er binnen deze groep kruisresistentie bestaat, dit middel afwisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.