

4 oktober 2023

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Pitvruchten	Schurft ¹	1,86 L/ha	6	5	35

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹Schurft (*Venturia* spp.)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in de onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing/en geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. lelie en tulp (onbedekte teelt)	Vuur ²	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	14
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)	Vuur ²	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Bolbloemen en knolbloemen	Vuur ²	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	14

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
(onbedekte teelt)				
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Vuur ²	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Potplanten (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Snijbloemen (bedekte teelt, niet-grondgebonden)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Trekheester (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Snijgroen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Boomkwekerij (pot en containerteelt) (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Boomkwekerij (pot en containerteelt) (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Laanbomen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Klimplanten (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Coniferen incl. kerstbomen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Sierheesters incl. rozen	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
(onbedekte teelt)				
Heide soorten (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	17
Bloemenzaadteelt (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5
Veredeling en zaadteelt m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras (bedekte teelt)	Echte meeldauw ³	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	5

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

² Vuur (*Botrytis* spp.)

³ Echte meeldauw (*Erysiphe* spp, *Microsphaera* spp, *Oidium* spp, *Sphaerotheca* spp.)

Het gebruik in de onbedekte teelt van tulp en lelie is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Lelie (onbedekte teelt)	Vuur ⁴	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	14
Tulp (onbedekte teelt)	Vuur ⁵	1,86 L/ha	6 per 12 maanden	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

⁴ Vuur (Botrytis elliptica)

⁵ Vuur (Botrytis tulipae)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de bedekte teelt van potplanten, snijbloemen, trekheesters en snijgroen het middel toepassen in 200-1200 liter water.

In de teelt van pitvruchten het middel alleen toepassen vanaf BBCH 53, (het openen van de knoppen (uitbotten) waarbij de bloemen nog omhuld zijn door de groene blaadjes) tot begin van het afrijpen (BBCH 81).

Werkzaamheid tegen schurft op fruit kan onvoldoende zijn, aangeraden wordt om het middel toe te passen in tankmix met toegelaten middelen.

Effecten op de fermentatie zijn niet beoordeeld.

Het middel kan een mogelijk effect hebben op de smaak van verwerkte peren.