

LALGUARD

M52^{OD}

Toelatingsnummer: 14883N (W1)
Aard van het Preparaat: OD (olie dispersie)
Werkzame stof: *Metarhizium brunneum* stam Ma 43
(ook gekend als *Metarhizium anisoplae* var. *anisoplae* stam F52)
11% w/w, minimaal 2x10¹² cfu/L

Vóór het gebruik de bijgevoegde
gebruiksaanwijzing lezen.

PROFESSIONEEL gebruik.

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK

NETTO INHOUD:
1 L

LALLEMAND

INSECTICIDE

LALGUARD M52^{OD}



Bevat *Metarhizium brunneum* stam Ma43. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P284 Adembescherming dragen.

Als u zich onwel voelt, haal dan onmiddellijk medisch advies
(toon het etiket indien mogelijk).

Was uw handen en blootgestelde huid voor het eten en na het werk.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Partijnummer: Zie bedrukking op fles.


Productiedatum: Zie bedrukking op fles.

Toelatingshouder:
DANSTAR FERMENT AG /
Lallemand Plant Care
Poststrasse 30
CH-6300 Zug
Zwitserland

© LALGUARD is een gedeponeerd handelsmerk
van Lallemand.



7 640 182 1242 12



LALLEMANDPLANTCARE.COM

9LK07GFGC-10/23

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

Approbation

Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve.
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

Mécanique à 100% du format final
SORTIE FINALE à 100%



M&H

87, RUE PRINCE, BUREAU 310
MONTREAL QC H3C 2M7
T. 514 866-6736 | STUDIOBN@MH.CA


WFP292650_LALGUARD_M52-OD_1L_NL_CMYK_01

2023-10-06

SL

Épreuve #1

Page 1



LALLEMAND

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitie lijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn
Aardbei (bedekte teelt)	mijten ²	0,12% (0,12 l per 100 l water)	2 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (bedekte teelt)	trips ¹ wittevlieg ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet- eetbare schil (bedekte teelt)	trips ¹ wittevlieg ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per teeltcyclus	3	4 uur
Vruchtgroenten van Solanaceae	trips ¹	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Ui-achtigen (onbedekte teelt)	trips ⁵	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Prei (onbedekte teelt)	trips ⁵	1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Gerbera (bedekte teelt)	wittevlieg ³	0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	–

1. Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)
2. Bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)
3. Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)
5. Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

Het gebruik in de teelt van aardbei (onbedekte teelt), oliehoudende zaden, vezelgewassen, peulvruchten, kers, pruim, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, vijg en kiwi, boon met peul (bedekte teelt), koolgewassen (bedekte teelt), stengelgroenten (bedekte teelt), kruidenteelt vers of gedroogd, de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt) en "onbedekte teelt van veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap" is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er zijn voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Type toepassing en Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn
Aardbei (onbedekte teelt)	trips ¹ mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Oliehoudende zaden	trips ⁵ wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Oliehoudende zaden	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Vezelgewassen	trips ⁵ wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Vezelgewassen	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	–
Peulvruchten	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per teeltcyclus	7	4 uur
Peulvruchten	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Lupine (peulvrucht)	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Veldboon (peulvrucht)	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Witlof (pennenteelt)	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Cichorei	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Graszodenteelt	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	–
Kers (bedekte teelt)	mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kers (onbedekte teelt)	mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Pruim (bedekte teelt)	vlinders ⁷	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Pruim (onbedekte teelt)	vlinders ⁷	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Kleinfruit	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Bessen (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Bessen (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} mijten ²	Gewasbehandeling 1,2 l/ha	1,2 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Approbation

Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve. Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

Mécanique à 100% du format final
SORTIE FINALE à 100%

M & H

M&H
87, RUE PRINCE, BUREAU 310
MONTREAL QC H3C 2M7
T. 514 866-6736 | STUDIOBN@MH.CA

WFP292650_LALGUARD_M52-OD_1L_NL_CMYK_01
2023-10-06
Épreuve #1

100%50%0%

SL
Page 2

LALLEMAND



Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Type toepassing en Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn
Druif (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Druif (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Braam- en framboosachtigen (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,5 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Vijg (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kiwi (bedekte teelt)	wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kiwi (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,2 l/ha	1,2 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Kiwi	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Bladgroenten	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met eetbare schil (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	9 per 12 maanden	7	4 uur
Vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet- eetbare schil (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	9 per 12 maanden	7	4 uur
Boon met peul (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Koolgewassen (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Koolgewassen (bedekte teelt)	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Wortel- en knolgewassen	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Asperge	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Stengelgroenten (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per teeltcyclus	3	4 uur

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Type toepassing en Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn
Kruidenteelt vers of gedroogd (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	4 uur
Kruidenteelt vers of gedroogd (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	4 uur
Kruidenteelt vers of gedroogd	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	4 uur
Gladiol (onbedekte teelt)	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	–
Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	–
Bloemisterijgewassen (grondgebonden bedekte teelt)	tripsoppen ^{1,5}	Grondbehandeling 10 l/ha	10 l/ha	2 per 12 maanden	7	–
Snijbloemen (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,8 l/ha	10 per 12 maanden	3	–
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	wittevlieg ³	Gewasbehandeling 0,12% (0,12 l per 100 l water)	1,25 l/ha	2 per 12 maanden	7	–
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	–
Potplanten (bedekte teelt)	kevers ³ tripsoppen ^{1,5}	Aangietbehandeling 0,23 l/m ³	0,23 l/m ³	2 per 12 maanden	7	–
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,125% (0,125 l per 100 l water)	1,5 l/ha	3 per teeltcyclus, 10 per 12 maanden	3	–
Sierheesters (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	–
Heide soorten (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	–
Bos- en haagplantsoen (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	–
Vruchtbomen en -struiken (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	–
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	–
Boomkwekerijgewassen, containerteelt	kevers ³	Aangietbehandeling 0,23 l/m ³	0,23 l/m ³	2 per 12 maanden	7	–



CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK



M&H

87, RUE PRINCE, BUREAU 310
MONTREAL QC H3C 2M7
T. 514 866-6736 | STUDIOBN@MH.CA

Approbation

Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve.
Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.Mécanique à 100% du format final
SORTIE FINALE à 100%


WFP292650_LALGUARD_M52-OD_1L_NL_CMYK_01

2023-10-06

SL

Épreuve #1

Page 3

**LALLEMAND**

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Type toepassing en Dosering (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 0,125% (0,125 l per 100 l water)	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	–
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	7	–
Vaste plantenteelt	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	–
Vaste planten, containerteelt	kevers ⁸	Aangietbehandeling 0,23 l/m ³	0,23 l/m ³	2 per 12 maanden	7	–
Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)	trips ^{1,4} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	10 per 12 maanden	3	–
Veredelingsteelt en zaadteelt (bedekte teelt)	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Grondbehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	–
Onbedekte teelt van: Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en wittlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap	trips ^{1,5} wittevlieg ^{3,4} mijten ²	Gewasbehandeling 1,25 l/ha	1,25 l/ha	6 per 12 maanden	7	–
Onbedekte teelt van: Veredeling en zaadteelt van groentegewassen, fruitgewassen, kruiden, sierteeltgewassen, bieten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestergewassen, voedergewassen en wittlof, cichorei, boekweit, hop en meekrap	ritnaalden ⁹ emelten ¹⁰	Bodembehandeling 5,6 l/ha	5,6 l/ha	2 per 12 maanden	7	–

1. Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

2. Bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

3. Kaswittevlieg (*Trialeurodes vaporariorum*)

4. Tabakswittevlieg (*Bemisia tabaci*)

5. Tabakstrips (*Thrips tabaci*)
6. Koolwittevlieg (*Aleyrodes proletella*)

7. Pruimenmot (*Cydia funebrana*)

8. Gegroefde lapsnuitkever / taxuskever (*Otiorynchus sulcatus*)

9. Ritnaalden (*Agriotes obscurus*)

10. Emelten (*Tipulidae*)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Let op: voor het gereed maken van de spuitvloeistof gelden speciale instructies, raadpleeg hiervoor de aanbevelingen van de fabrikant.
Bij toepassing via grondbehandeling het middel toepassen in 300-400 liter water per hectare.
Bij toepassing als gewasbehandeling het middel toepassen in de volgende spuitvolumes:

- In de onbedekte teelt van vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare en niet eetbare schil het middel toepassen in 300-1500 liter water per hectare.
- In de teelt van ui-achtigen en prei het middel toepassen in 200-1500 liter water per ha.
- In de teelt van aardbei (onbedekte teelt) het middel toepassen in 300-1600 liter water per ha.
- In de teelt van bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), vruchtgroenten van cucurbitaceae met eetbare en niet eetbare schil (onbedekte teelt), bolbloemen en knolbloemen (onbedekte teelt) het middel toepassen in 300-1500 liter water per ha.

- In de teelt van bessen, druif en braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt) het middel toepassen in 400-1200 liter water per ha.
- In de teelt van boomkwekerijgewassen het middel toepassen in 300-1200 Liter water per ha.
- In de onbedekte teelt van sierheesters, heide soorten, bos en haagplantsoen en vruchtbomen het middel toepassen in een watervolume van 200-1000 liter per hectare.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden bij gebruik in bedekte teelten. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

De gewasveiligheid van LALGUARD M52 OD in de wintermaanden is voor de bedekte teelten van aardbei, vruchtgroenten van cucurbitaceae met en zonder eetbare schil, vruchtgroenten van solanaceae en gerbera niet onderbouwd. Voer een proefbespuiting uit voordat LALGUARD M52 OD in de bedekte teelt van deze gewassen op grote schaal toegepast wordt.

AANBEVELINGEN

ALGEMEEN

LALGUARD M52 OD is een op micro-organismen gebaseerde insecticide die de entomopathogene schimmel *Metarhizium brunneum* stam Ma 43 (11% w/w, minimaal 2x10¹² cfu/L) bevat, een natuurlijk voorkomende insectparasitaire schimmel die niet genetisch gemodificeerd is. Na contact met het lichaam van het beoogde insect kiemen sporen van *Metarhizium brunneum*. Deze dringen vervolgens door in het lichaam en groeien binnen in het insect. Er worden dan nieuwe sporen gevormd vanaf de schimmeldraden die uit het dode insect groeien.

BEREIDING VAN DE OPLOSSING

Schud de fles krachtig gedurende ongeveer 1 minuut.
Giet ongeveer 1/3 van de fles in een schone container van min. 5 liter.
Schud de overige twee derden van de fles gedurende nog een minuut.
Open de fles en draai hem ondersteboven zodat de hele vloeistof geleegd wordt in de container van 5 liter.
Zorg ervoor dat alle vloeistof en sporen verwijderd zijn van de bodem van de fles door de fles te spoelen en te schudden met ongeveer 250 ml water.
Giet de overblijvende inhoud in de container van 5 liter. Vul de spuittank met de nodige hoeveelheid water.
Giet de productinhoud van de container van 5 liter in de spuittank en schud goed. Spuit onmiddellijk na bereiding.
Spuitoplossing na klaarmaken direct verspuiten en niet in direct zonlicht plaatsen.

OPMERKINGEN

Sporen van *Metarhizium brunneum* stam Ma 43 zijn actief bij temperaturen tussen +15°C en +32°C en hebben een optimale activiteit tussen +25°C en +30°C. Buiten het temperatuurbereik van +15°C à +32°C kan de activiteit verminderd zijn maar blijven de sporen leven, tenzij de temperatuur boven +40°C gaat, waarna de vitaliteit van de sporen snel afneemt.
LALGUARD M52 OD kan gebruikt worden als een onderdeel van geïntegreerde plaagbestrijding.
Het product is getest op een reeks nuttige insecten en hommels: er zijn geen schadelijke effecten gezien in kasomstandigheden.
LALGUARD M52 OD mag niet gemengd worden met andere gewasbeschermingsmiddelen.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN BIJ HERBETREDING

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is); werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

OPSLAG

Houd het product uit de buurt van eten, drank en dierenvoer.
Bewaar het product op een koele, droge, goed geventileerde ruimte.
Bescherm het product tegen direct zonlicht.
Bewaar het product niet boven +20°C. Bewaar het bij voorkeur bij +4°C. Vorstvrij bewaren.
LALGUARD M52 OD is 24 maanden houdbaar indien bewaard bij +4°C of bij kamertemperatuur (ongeveer +20°C).

AFVOER

Zodra geopend, gebruik de volledige inhoud.
Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.
Was de container grondig uit en voer hem op geschikte wijze af.
Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (P501).

CYAN

MAGENTA

YELLOW

BLACK

M & H

MONTREAL QC H3C 2M7

T. 514 866-6736 | STUDIOBN@MH.CA

WFP292650_LALGUARD_M52-OD_1L_NL_CMYK_01

2023-10-06

Épreuve #1

SL

Page 4

100%

50%

0%

LALLEMAND

Bien que tous les efforts aient été mis en œuvre pour éviter toute erreur, S.V.P., bien vérifier cette épreuve. Notre responsabilité se limite au remplacement des fichiers finaux.

Mécanique à 100% du format final

SORTIE FINALE à 100%